	<p align="center"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU GERÊNCIA DE ENFERMAGEM Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp - Campus de Botucatu CEP 18618-687– Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 / (14) 3811-6000. E-mail </p>	POP GE 055 - Pág.: 1 / 4
		Emissão: 07/05/2015
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM		Revisão nº: 02 Última Revisão:05/02/2019
POP GE 055 – PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE FLUIDOS POR HIPODERMÓCLISE		

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 055 – ADMINISTRAÇÃO DE FLUÍDOS POR HIPODERMÓCLISE

1. **OBJETIVO:** Administração lenta de soluções no tecido subcutâneo, contínuo ou intermitente.
2. **ABRANGÊNCIA:** Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
3. **MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:**
 - 3.1. **Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** luvas de procedimento, máscara descartável, óculos de proteção.
 - 3.2. **Materiais Específicos para o Procedimento:** Bandeja; algodão; 01 dispositivo de punção de média duração (Abocath® ou Íntima®) n° 22 ou 24, 01 almotolia de álcool 70INPM, 01 seringa preparada com 03 ml de soro fisiológico 0,9% (SF 0,9%), 1 curativo filme transparente, 01 equipo comum, medicação a ser administrada.
4. **PROCEDIMENTO:**
 1. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou com álcool gel (mínimo 15 segundos);
 2. Providenciar os materiais;
 3. Reunir na bandeja;
 4. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou com álcool gel (mínimo 15 segundos);
 5. Preparar a seringa de 3ml aspirando 3 ml de SF0,9%, mantendo a agulha conectada e a extremidade protegida com a tampa e com o invólucro do material;
 6. Dirigir-se ao leito do paciente;
 7. Colocar a bandeja com os materiais na mesa auxiliar;
 8. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou com álcool gel (mínimo 15 segundos);
 9. Perguntar para o paciente e/ou acompanhante: “Qual é seu nome completo?”, “Qual é sua data de nascimento?”, “Sabe seu número de registro hospitalar?”;

Elaboração: Enfª Natália Cristina Godinho	Aprovação Presidente Comissão de Revisão dos POPs e Gerência de Enfermagem: Enfª. Márcia Cercal Fernandes e Bárbara Nery dos Santos
	Aprovação CCIRAS: Enfª Adriana Estela Biasotti Gomes, Érika Cibele Pereira Pavan, Elaine Silva Freitas.
Revisão: Enfª Karina Alexandra B. S. Freitas, Natália Cristina Godinho, Márcia Cercal Fernandes.	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Enfª Maria Zoe Turchiari de Melo, Enfª Márcia Cercal Fernandes

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU GERÊNCIA DE ENFERMAGEM Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp - Campus de Botucatu CEP 18618-687– Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 / (14) 3811-6000. E-mail	POP GE 055 - Pág.: 2 / 4
		Emissão: 07/05/2015
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM		Revisão nº: 02
		Última Revisão:05/02/2019
POP GE 055 – PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE FLUIDOS POR HIPODERMÓCLISE		

10. Conferir os dados da pulseira/etiqueta de identificação com os dados relatados;
11. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente e /ou acompanhante;
12. Inspecionar o local a ser puncionado;
13. Escolher o local de punção com maior tecido adiposo e que proporcione melhor mobilidade ao paciente;
14. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou com álcool gel (mínimo 15 segundos);
15. Colocar máscara descartável e óculos de proteção;
16. Calçar as luvas de procedimento;
17. Abrir o invólucro do dispositivo de punção de média duração;
18. Preencher o dispositivo com soro fisiológico 0,9%;
19. Realizar antisepsia da pele com algodão embebido em álcool 70 INPM;
20. Retirar o protetor do dispositivo de punção;
21. Fazer a prega subcutânea com a mão não dominante;
22. Introduzir o dispositivo na pele suavemente, com a mão dominante em um ângulo de 30 a 45° com o bisel voltado para cima;
23. Conectar a seringa no dispositivo e aspirar para verificar a ausência de retorno sanguíneo;
24. Administrar 01 ml de SF 0,9% e verificar se há presença de extravasamento intradérmico;
25. Fixar o dispositivo com curativo filme transparente;
26. Conectar o equipo da solução ao dispositivo;
27. Retirar as luvas de procedimento;
28. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou com álcool gel (mínimo 15 segundos);
29. Identificar o acesso subcutâneo com data, nome de quem puncionou, horário, calibre do cateter;

Elaboração: Enfª Natália Cristina Godinho	Aprovação Presidente Comissão de Revisão dos POPs e Gerência de Enfermagem: Enfª. Márcia Cercal Fernandes e Bárbara Nery dos Santos
	Aprovação CCIRAS: Enfª Adriana Estela Biasotti Gomes, Érika Cibele Pereira Pavan, Elaine Silva Freitas.
Revisão: Enfª Karina Alexandra B. S. Freitas, Natália Cristina Godinho, Márcia Cercal Fernandes.	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Enfª Maria Zoe Turchiari de Melo, Enfª Márcia Cercal Fernandes

	<p align="center"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU GERÊNCIA DE ENFERMAGEM Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp - Campus de Botucatu CEP 18618-687– Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 / (14) 3811-6000. E-mail </p>	POP GE 055 - Pág.: 3 / 4
		Emissão: 07/05/2015
<p align="center"> MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM </p>		Revisão nº: 02
		Última Revisão:05/02/2019
POP GE 055 – PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE FLUIDOS POR HIPODERMÓCLISE		

30. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
31. Retirar a máscara descartável e óculos de proteção;
32. Calçar luva de procedimento na mão dominante;
33. Desprezar os materiais em local apropriado com a mão dominante;
34. Lavar a bandeja e óculos de proteção com água e sabão, após secar e friccionar álcool 70INPM e guardar em seus locais;
35. Manter a unidade limpa e em ordem;
36. Retirar as luvas de procedimentos;
37. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
38. Realizar as anotações de enfermagem no Sistema de Informação Hospitalar.

5. CONTINGÊNCIA:


1. Caso o SIH – Sistema de Informação Hospitalar esteja indisponível, a solicitação dos materiais deverá ser realizada manualmente e posteriormente solicitado no sistema.

6. OBSERVAÇÕES:

1. A escolha do calibre do dispositivo poderá variar de acordo com o volume infundido e tecido subcutâneo do paciente;
2. Os principais locais para administração são: deltóide, anterior do tórax, escapular, abdominal e face lateral da coxa, conforme figura anexa;
3. Realizar rodízio do local de punção de 5 a 7 dias de acordo com as condições da pele e mobilidade do paciente;
4. A região torácica deverá ser evitada em pacientes caquéticos;
5. Para infusão contínua utilizar bomba de infusão.

Elaboração: Enfª Natália Cristina Godinho	Aprovação Presidente Comissão de Revisão dos POPs e Gerência de Enfermagem: Enfª. Márcia Cercal Fernandes e Bárbara Nery dos Santos
	Aprovação CCIRAS: Enfª Adriana Estela Biasotti Gomes, Érika Cibele Pereira Pavan, Elaine Silva Freitas.
Revisão: Enfª Karina Alexandra B. S. Freitas, Natália Cristina Godinho, Márcia Cercal Fernandes.	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Enfª Maria Zoe Turchiari de Melo, Enfª Márcia Cercal Fernandes

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU GERÊNCIA DE ENFERMAGEM Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp - Campus de Botucatu CEP 18618-687– Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6220 / (14) 3811-6000. E-mail	POP GE 055 - Pág.: 4 / 4
		Emissão: 07/05/2015
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM		Revisão nº: 02
		Última Revisão:05/02/2019
POP GE 055 – PUNÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE FLUIDOS POR HIPODERMÓCLISE		



Fonte: Adaptado Bruno, V.G. Hipodermóclise: revisão de literatura para auxiliar a prática clínica. Einstein, v.13, n.1, p.122-8, 2015.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. FELIPPE, MJDB; MENDONÇA, AM; PRANUVI, MB. **Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Terceiro Andar Esquerdo – Administração de Medicamentos**. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
2. GUERRERO, GP; BECCARIA, ML.; TREVIZAN, MA. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. **Rev.Latino-am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p.966-972, 2008.
3. AZEVEDO, DL. **O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados**; SBGG; Rio de Janeiro. 2016. 56 p.
4. GODINHO, NC; SILVEIRA, LVA. **Manual de hipodermóclise [recurso eletrônico]** . Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Medicina de Botucatu, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB, 2017.30p. ISBN: 978-85-69376-05-7.

Elaboração: Enfª Natália Cristina Godinho	Aprovação Presidente Comissão de Revisão dos POPs e Gerência de Enfermagem: Enfª. Márcia Cercal Fernandes e Bárbara Nery dos Santos
	Aprovação CCIRAS: Enfª Adriana Estela Biasotti Gomes, Érika Cibele Pereira Pavan, Elaine Silva Freitas.
Revisão: Enfª Karina Alexandra B. S. Freitas, Natália Cristina Godinho, Márcia Cercal Fernandes.	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Enfª Maria Zoe Turchiari de Melo, Enfª Márcia Cercal Fernandes