

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 1 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			<p>Revisão nº:</p>

1. INTRODUÇÃO

Levando em consideração a escalada do número de ocorrências de funcionários e pacientes com Síndrome Gripal no Complexo Autárquico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (CAHCFMB) – UNESP, a Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência em Saúde (CCIRAS) e o Serviço de Infectologia propõe novas regras e novo fluxograma de manejo de isolamento e quarentena para funcionários com sintomas gripais e/ou contactantes de Covid-19 e Influenza.




Atualizamos as regras de liberação de isolamento para contactantes domiciliares e também para contactantes intra-hospitalares de casos confirmados de Covid-19. Adicionamos informações referentes aos contatos intra-hospitalares de Influenza.

O novo protocolo para funcionários sintomáticos também foi atualizado e vem organizado em duas sessões: a primeira em um cenário de disponibilidade de teste rápido e RT-PCR para SARS-CoV-2 (sessão 1), e a segunda em um cenário de disponibilidade apenas de RT-PCR para SARS-CoV-2 (sessão 2). O protocolo baseado em teste rápido (sessão 1) deve ser preferencialmente utilizado, quando este recurso estiver disponível no serviço.

Este documento visa dar celeridade ao processo de testagem e aconselhamento aos funcionários sintomáticos respiratórios e também aos pacientes internados e contactantes de casos positivos neste período crítico de pandemia, no qual observamos a circulação simultânea de variantes de interesse (VoCs) do SARS-CoV-2, bem como cepas de Influenza (em especial H3N2).

2. OBJETIVO

Orientar as equipes de trabalho do CAHCFM quanto às ações em relação as várias situações possíveis de funcionários com sintomas gripais e como contactantes de familiares em critérios de suspeição ou com Covid-19 confirmada.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 2 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			<p>Revisão nº:</p>

3. PÚBLICO ALVO

Equipe médica e equipe multiprofissional do CAHCFMB.

4. CONDUTA

4.1. Isolamento de Pacientes Internados Imunocompetentes – Covid-19

- Pacientes imunocompetentes internados com diagnóstico de Covid-19 leve (sem sinais de insuficiência respiratória ou acometimento de outros órgãos e sistemas): Isolamento de 10 dias a partir do início dos sintomas ou da data do teste positivo (no caso de assintomáticos ou quando não for possível determinar a data exata do início dos sintomas). Não está indicada testagem de controle para abertura do isolamento, o paciente deve estar em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas, e todas as liberações devem ser realizadas via interconsulta para o “libera isolamento”.




- Pacientes imunocompetentes internados com diagnóstico de Covid- 19 grave (SRAG – StO2 < 94% e/ou FR > 30 ipm e/ou PaO2/FiO2 < 300 e/ou acometimento pulmonar > 50%): Isolamento de pelo menos 20 dias a partir do início dos sintomas ou da data do teste positivo (quando não for possível determinar a data exata do início dos sintomas). Não está indicada testagem de controle para abertura do isolamento, o paciente deve estar em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas, e todas as liberações devem ser realizadas via interconsulta para o “libera isolamento”.

4.2. Isolamento de pacientes Internados Imunossuprimidos – Covid-19

Pacientes gravemente imunossuprimidos podem estar sujeitos a maior tempo de excreção viral quando infectados pelo SARS-CoV-2, especialmente quando apresentam quadros moderados a graves, com necessidade de internação hospitalar e oxigenioterapia.

4.2.1. Definição de imunossupressão:

- Transplantados de órgãos sólidos.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 3 /16</p> <hr/> <p>Emissão: 01/2022</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			




- Pacientes com cânceres hematológicos
- Pacientes com transplante de medula óssea.
- Pacientes com neoplasias em tratamento quimioterápico.
- Pacientes com HIV não tratado (CD4 < 200 células).
- Imunodeficiências primárias.
- Pacientes em uso de drogas imunossupressoras (ex: tacrolimus, micofenolato, rituximab, ou prednisona em dose \geq 20mg/dia por mais de 14 dias).

4.3. Critérios para solicitação de interconsulta para libera isolamento:

- Pelo menos 20 dias após dia do início dos sintomas **E**
- Pelo menos 24 horas afebril **E**
- Melhora clínica (melhora da tosse, extubação/parâmetros mínimos na ventilação mecânica) **E**
- Swab nasal de controle negativo, coletado no momento da melhora, ou a partir do 20º dia de sintoma.

Considerações:

- Caso o swab de controle do 20º dia ainda seja positivo, manter paciente em isolamento e coletar novo controle a cada 7 dias, até negativação.
- Em caso de alta hospitalar, os pacientes deverão coletar swab de controle no prédio de ambulatorios (Atendimentos em COVID-19 no sexto andar – agendamentos realizados pela própria equipe do Serviço de Transplantes – ramal 6547)
- Em caso de dúvidas ou para discussão dos casos, entrar em contato com a CCIRAS.

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 4 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			<p>Revisão n°:</p>

4.4. Isolamento de pacientes Internados – Influenza

- Pacientes **imunocompetentes** internados com diagnóstico de Influenza: Isolamento por gotículas, por 7 dias a partir do início dos sintomas ou da data do teste positivo (no caso de assintomáticos ou quando não for possível determinar a data exata do início dos sintomas). Não está indicada testagem de controle para saída do isolamento, o paciente deve estar em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas, e todas as liberações devem ser realizadas via interconsulta para o “libera isolamento”.

- Pacientes **imunossuprimidos** internados com diagnóstico de Influenza: Isolamento por gotículas, de pelo menos 14 dias a partir do início dos sintomas ou da data do teste positivo (quando não for possível determinar a data exata do início dos sintomas). Nesta situação, está indicada a testagem de controle, com teste rápido de Influenza negativo, e o paciente deve estar em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas, e todas as liberações devem ser realizadas via interconsulta para o “libera isolamento”.




4.5. Quarentena de Contactantes Internados (Pacientes)

4.5.1. Definição de Contactante:

- Pacientes que apresentaram contato próximo com outros pacientes ou visitantes (familiares, por exemplo), que estejam com Covid-19 ou Influenza confirmados.
- O contato próximo é definido como contato por mais de 15 minutos com uma distância menor que 2 metros e sem máscara ou em uso de máscaras de pano.
- Contato próximo também é definido para pacientes que estejam internados no mesmo quarto, por pelo menos 4 horas.


4.5.2. Contatos de Influenza (pacientes internados):




- Os contactantes próximos de pacientes confirmados para Influenza deverão realizar profilaxia pós-exposição com Oseltamivir, na dose de 75mg/dia, por 7 dias, para pacientes com função renal dentro da normalidade (Clearance de creatinina > 60 mg/dL). Esses pacientes não

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 5 /16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

devem ser isolados, a não ser que apresentem sintomas gripais e a vigilância dos sintomas deve ser contínua.

Fluxograma 1. Manejo de contactantes próximos de pacientes confirmados para Influenza.







	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 6 /16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

4.5.3. Contatos de Covid-19 (pacientes internados):

- Os contactantes próximos de pacientes confirmados para Covid-19 deverão ser isolados (contato e gotículas) por 7 dias, a partir do último contato. Todos os contactantes deverão ser submetidos a um RT-PCR para SARS-CoV-2, no quinto dia do contato, e poderão ser liberados do isolamento mediante exame negativo e interconsulta para o “libera isolamento”, desde que estejam assintomáticos.




Fluxograma 2. Manejo de contactantes próximos de pacientes confirmados para Covid-19.






	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 7 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
		<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

4.6. Sessão 1: Protocolo para funcionários sintomáticos, com disponibilidade de Teste Rápido (antígeno viral) para SARS-CoV-2.


1. Funcionários que apresentem sintomas compatíveis com resfriado comum e/ou Síndrome Gripal (mal-estar, prostração, coriza ou obstrução nasal, dor de garganta, espirros, tosse, mialgia, artralgia, febre, conjuntivite, anosmia, disgeusia, diarreia, dor abdominal, vômitos) deverão ser submetidos a um teste rápido de antígeno nasal para SARS-CoV-2 até o quinto dia do início dos sintomas. No caso de reatividade (teste positivo), será considerado caso confirmado de Covid-19 e deverá ser afastado das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas (funcionário vacinado com esquema completo para Covid-19). O funcionário poderá retornar ao trabalho a partir do 8º dia desde que esteja assintomático e afebril há pelo menos 24 horas, e a volta ao trabalho está condicionada ao uso imprescindível de máscara e atenção redobrada às medidas de distanciamento social e às regras de utilização de copas e áreas comuns. Ressaltamos que se o funcionário não apresentar comprovante vacinal completo com pelo menos 2 doses de vacina contra a Covid-19, o isolamento deverá ser mantido por pelo menos 10 dias. Em caso de manutenção dos sintomas, o período de afastamento deve ser prolongado.
2. Funcionários com resultado não reagente para teste rápido de antígeno nasal (negativo) para SARS-CoV-2 deverão ser submetidos a teste rápido para Influenza. No caso de positividade, o funcionário deverá ser afastado das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas e poderá voltar às atividades a partir do 8º dia, desde que esteja em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas.
3. No caso de teste rápido de antígeno nasal para SARS-CoV-2 não reagente e teste rápido de Influenza não reagente, o funcionário deverá ser liberado para o trabalho.
4. Funcionários do setor de Neonatologia com teste rápido de antígeno nasal para SARS-CoV-2 e Influenza não reagentes, deverão ser submetidos a teste rápido para Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Em caso de positividade, deverão ser afastados das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas e poderão voltar às atividades a partir do 8º dia, desde que estejam em melhora dos sintomas e afebris há pelo menos 24 horas.




	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 8 /16</p> <hr/> <p>Emissão: 01/2022</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

5. Funcionários da Neonatologia com os três testes rápidos não reagentes (SARS-CoV-2, Influenza e VSR) deverão ser liberados para o trabalho.
6. Tendo em vista a alta sensibilidade dos testes rápidos para os três patógenos em questão, é possível manter a estratégia de isolamento e liberação para o trabalho a partir desses testes.
7. Em caso de piora de sintomas respiratórios e recorrência de febre, após testes rápidos negativos, estará indicada a coleta de RT-PCR para SARS-CoV-2.
8. A coleta de pool de saliva para rastreio de trabalhadores assintomáticos (rotina) deverá ser mantida conforme programação da diretoria do Hospital das Clínicas de Botucatu.
9. Casos excepcionais deverão ser discutidos com a Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (CCIRAS).

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 9 / 16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p> <p>Revisão n°:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			




Fluxograma 3: Manejo de Síndrome Gripal de Funcionários do Hospital das Clínicas de Botucatu – Estratégia Teste Rápido (Antígeno Viral).






	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 10 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			<p>Revisão nº:</p>

4.6. Sessão 2: Protocolo para funcionários sintomáticos, em cenário com disponibilidade de RT-PCR para SARS-CoV-2.


1. Funcionários que apresentem sintomas compatíveis com resfriado comum e/ou Síndrome Gripal (mal-estar, prostração, coriza ou obstrução nasal, dor de garganta, espirros, tosse, mialgia, artralgia, febre, conjuntivite, anosmia, disgeusia, diarreia, dor abdominal, vômitos) deverão ser submetidos a um teste de RT-PCR para SARS- CoV-2, entre o terceiro e, preferencialmente, até o quinto dia do início dos sintomas. Se o teste for positivo, o trabalhador (vacinado com esquema completo para covid-19) deverá ser afastado das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas. O funcionário poderá retornar ao trabalho a partir do 8º dia desde que esteja assintomático e afebril há pelo menos 24 horas, e a volta ao trabalho está condicionada ao uso imprescindível de máscara e atenção redobrada às medidas de distanciamento social e às regras de utilização das copas e áreas comuns. Ressaltamos que se o funcionário não apresentar comprovante vacinal completo com pelo menos 2 doses de vacina contra a covid-19, o isolamento deverá ser mantido por pelo menos 10 dias. Em caso de manutenção dos sintomas, o período de afastamento deve ser prolongado.
2. Funcionários com resultado negativo no RT-PCR para SARS-CoV-2 deverão ser submetidos a teste rápido para Influenza. No caso de positividade, o funcionário deverá ser afastado das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas e poderá voltar às atividades a partir do 8º dia, desde que esteja em melhora dos sintomas e afebril há pelo menos 24 horas.
3. No caso de RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo e teste rápido de Influenza não reagente, o funcionário deverá ser liberado para o trabalho.
4. Funcionários do setor de Neonatologia com RT-PCR negativo para SARS-CoV-2 e Influenza não reagentes, deverão ser submetidos a teste rápido para Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Em caso de positividade, deverão ser afastados das atividades por 7 dias a partir do início dos sintomas e poderão voltar às atividades a partir do 8º dia, desde que estejam em melhora dos sintomas e afebris há pelo menos 24 horas.
5. Funcionários da Neonatologia com RT-PCR para SARS-CoV-2 e os outros dois testes rápidos não reagentes (Influenza e VSR) deverão ser liberados para o trabalho.




	<p style="text-align: center;"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR </p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 11 /16</p> <hr/> <p>Emissão: 01/2022</p>
	<p style="text-align: center;"> PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA </p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

6. A coleta de pool de saliva para rastreio de trabalhadores assintomáticos (rotina) deverá ser mantida conforme programação da diretoria do Hospital das Clínicas de Botucatu.
7. Casos excepcionais deverão ser discutidos com a Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência em Saúde (CCIRAS).

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 12 /16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>		<p>Emissão: 01/2022</p>
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

Fluxograma 4: Manejo de Síndrome Gripal de Funcionários do Hospital das Clínicas de Botucatu – Estratégia RT-PCR.



	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 13 /16</p> <hr/> <p>Emissão: 01/2022</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

4.7. Quarentena de Funcionários Contactantes




4.7.1. Definição de Contactante:

- O contato próximo é definido como contato por mais de 15 minutos com uma distância menor que 2 metros e sem máscara ou em uso de máscaras de pano, com caso confirmado de Covid-19 ou Influenza.


- Contactantes domiciliares (moradores de mesma residência).

4.7.2. Contatos de Influenza (funcionários):

- Os funcionários contactantes próximos de casos confirmados para Influenza deverão realizar profilaxia pós-exposição com Oseltamivir, na dose de 75mg/dia, por 7 dias, para funcionários com função renal dentro da normalidade (Clearance de creatinina > 60 mg/dL). Não há necessidade de afastamento das atividades e a vigilância dos sintomas deve ser contínua.




	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 14 /16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p> <p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

Fluxograma 5: Manejo de Funcionários contactantes próximos de casos confirmados de Influenza no Hospital das Clínicas de Botucatu.




4.7.3. Contatos de Covid-19 (funcionários):




- Os funcionários contactantes próximos de casos confirmados para Covid-19 deverão ser afastados das atividades por 7 dias a partir do último contato. Todos os funcionários

	<p style="text-align: center;">HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 15 /16</p>
	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p> <p>Revisão nº:</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			

contactantes deverão ser submetidos a um RT-PCR para SARS-CoV-2 no quinto dia do contato e poderão ser liberados para suas atividades mediante exame negativo. Ressaltamos que a volta ao trabalho está condicionada ao uso imprescindível de máscara e atenção redobrada às medidas de distanciamento social e às regras de utilização das copas e áreas comuns. O período de incubação da Covid-19 é de até 14 dias e, durante esse período, a vigilância dos sintomas deve ser reforçada, e, caso o funcionário torne-se sintomático, deve ser testado novamente.

Fluxograma 6: Manejo de funcionários contactantes próximos de casos confirmados para Covid-19.



	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro s/n – Unesp – Campus de Botucatu CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil TEL. (14) 3811-6037 / FAX (14) 3811-6179 E-MAIL: CCIRAS.HCFMB@UNESP.BR</p>		<p>PRAS CCIRAS 013 – Pág.: 16 /16</p>
	<p>PROTOCOLO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) E DO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA</p>	<p>Emissão: 01/2022</p>	
<p>PRAS CCIRAS 013 – PROTOCOLO DE MANEJO DE AFASTAMENTOS, ISOLAMENTOS E QUARENTENAS PARA SÍNDROME GRIPAL</p>			<p>Revisão nº:</p>

5. AUTORIA

- Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS);
- Serviço de Infectologia.

6. REFERÊNCIAS

1. Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa – Número 07/2020 – Orientações para a Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por SARS-CoV-2 (Covid-19) dentro dos Serviços de Saúde.
2. Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention). Prevention Strategies for Seasonal Influenza in Healthcare Settings. Guidelines and Recommendation. Site: <https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm#:~:text=Droplet%20precautions%20should%20be%20implemented,is%20in%20a%20healthcare%20facility.>
3. Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention) RSV Transmission. Site: <https://www.cdc.gov/rsv/about/transmission.html>
4. Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention). Discontinuation of Transmission-Based Precautions and Disposition of Patients with SARS-CoV-2 Infection in Healthcare Settings.
5. Recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) ao CONASS, 11/01/2022.