PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 1 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO Nº: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

1. INTRODUÇÃO

O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo, pois em 90% dos casos diagnosticados, está associado ao tabagismo. Altamente letal, a sobrevida média cumulativa total em cinco anos varia entre 13% e 21% em países desenvolvidos e entre 7% e 10% nos países em desenvolvimento. No Brasil, entre 2005- 2009, foi o tipo de câncer que mais fez vítimas entre os homens e foi o segundo mais letal entre as mulheres. O fator de risco mais importante para ocorrência do câncer de pulmão é o tabagismo. Fumantes têm o risco duplicado de desenvolver a doença, em relação aos não fumantes, risco que está relacionado à quantidade de cigarros consumida, duração do hábito e idade em que iniciou o tabagismo. A cessação do tabagismo a qualquer tempo resulta na diminuição do risco de desenvolver câncer de pulmão. O tabagismo passivo, exposição ambiental ao gás radônio e exposição ocupacional prévia à mineração de amianto constituem fatores de risco adicionais para a doença.

O câncer de pulmão é dividido de acordo com o tipo de células presentes no tumor e cada tipo de câncer se desenvolve e tem tratamento diferente. Os dois principais são o câncer de células não pequenas, que é o mais comum, e o câncer de células pequenas.

O câncer de pulmão de células não pequenas se subdivide em três categorias: o adenocarcinoma, que tem origem nas células dos alvéolos, que produzem muco, e é mais comum em não fumantes; o câncer de células escamosas, ou epidermoides, que começa nas células achatadas dos pulmões e é causado pelo fumo; e o câncer de células grandes, que começa em células grandes do pulmão. Já o câncer de pulmão de células pequenas representa menos de 20% dos casos e quase sempre está associado ao uso de tabaco. Geralmente começa nos brônquios, mas cresce rapidamente e se espalha para outras partes do corpo, incluindo os gânglios linfáticos.

A seleção do tratamento deverá ser adequada ao estadiamento clínico da doença (classificação TNM), capacidade funcional (escala ECOG/Zubrod), condições clínicas e preferência do doente.

Este protocolo abordará os tipos de tratamento de acordo com o estadiamento do câncer de pulmão de células não pequenas.

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 2 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO Nº: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

2. OBJETIVO

Padronizar o tratamento do câncer de pulmão (não pequenas células) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

3. PÚBLICO-ALVO

O protocolo tem como público-alvo as equipes médicas que atuam na oncologia.

4. CONDUTA

4.1. ESTADIAMENTO (AJCC 2010)

TX: tumor primário não avaliável; T0: sem evidências de tumor primário; Tis: tumor in situ; T1: tumor ≤ 3 cm circundado por pulmão ou pleura visceral e sem evidência broncoscópica de invasão mais proximal que o brônquio lobar; T1a: tumor ≤ 2 cm; T1b: tumor > 2 e ≤ 3 cm; T2: tumor > 3 e ≤ 7 cm e/ou envolvimento do brônquio principal 2 cm ou mais distal à carina e/ou invasão da pleura visceral e/ou associação com atelectasia ou pneumonite obstrutiva que se estende à região hilar, mas não envolve todo o pulmão; T2a: tumor > 3 e ≤ 5 cm; T2b: tumor > 5 e ≤ 7 cm; T3: tumor > 7 cm ou de qualquer tamanho que diretamente invade a parede torácica (incluindo tumor de sulco superior), diafragma, nervo frênico, pleura mediastinal, pericárdio parietal, ou tumor no brônquio principal a menos de 2 cm da carina, mas sem o seu envolvimento, ou presença de atelectasia ou pneumonite obstrutiva de todo o pulmão, ou nódulos tumorais separados no mesmo lobo; T4: tumor de qualquer tamanho que invade mediastino, coração, grandes vasos, traqueia, nervo laríngeo recorrente, esôfago, carina, corpo vertebral (chamado T4 invasivo) ou nódulos tumorais separados em diferentes lobos ipsilaterais. NX: linfonodos não podem ser avaliados; N0: sem metástase em linfonodos regionais; N1: metástases em linfonodos peribrônquicos e/ou hilares ipsilaterais e linfonodos intrapulmonares; N2: metástases em mediastino ipsilateral e/ou linfonodos subcarinais; N3: metástases em mediastino contralateral, hilo contralateral, escaleno ipsilateral ou contralateral ou linfonodos supraclaviculares. M0: ausência de metástases à distância; M1: metástase à distância; M1a: nódulos tumorais separados em lobos contralaterais, nódulos pleurais, ou derrame pleural ou pericárdico maligno; M1b: metástase à distância.

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 3 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO Nº: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

4.1.1. Agrupamento

Carcinoma oculto: T0N0M0; 0: TisN0M0; IA: T1N0M0; IB: T2aN0M0; IIA: T1N1M0, T2bN0M0, T2aN1M0; IIB: T2bN1M0, T3N0M0; IIIA: T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-1M0; IIIB: qqTN3M0, T4N2M0; IV: qqTqqNM1.

4.1.2. Como Estadiar

Hemograma com plaquetas, desidrogenase láctica (DHL), fosfatase alcalina, enzimas hepáticas, bilirrubinas totais e frações, creatinina e cálcio sérico, ressonância nuclear magnética (RNM) de cérebro (principalmente nos adenocarcinomas em estádios II e III), tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdome superior e cintilografia óssea. Se disponível, substituir os exames de imagem por tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET-TC).

A realização do exame por PET-TC não elimina a necessidade de realização da ressonância magnética (RNM) de cérebro. Em pacientes com adenopatia mediastinal suspeita, por TC de tórax ou PET-TC, há necessidade de obter comprovação histológica da presença ou ausência do comprometimento linfonodal através de ultrassonografia (US) endoscópica (brônquica ou esofágica) com biópsia e/ou mediastinoscopia.

Obs.: embora não faça parte do estadiamento, cabe ressaltar que os pacientes com adenocarcinoma em estadio IV devem ser testados para mutação do EGFR, assim que possível.

4.2. TRATAMENTO ADJUVANTE

4.2.1. Estádio patológico I

- Sem indicação de tratamento adjuvante.

4.2.2. Estádio patológico II, sem comprometimento linfonodal

- Discutir quimioterapia (QT) adjuvante em pacientes com tumor > 4 cm, mesmo que não haja comprometimento linfonodal (ver esquemas em Estádio patológico II com comprometimento linfonodal e IIIA).

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 4 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO Nº: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

4.2.3. Estádios patológicos II (N1) a IIIA

- QT adjuvante por 4 ciclos, baseada em cisplatina e vinorelbina (cisplatina, 50 mg/m² EV, nos D1 e D8, a cada 4 semanas, e vinorelbina, 25 mg/m² EV, semanalmente) (APAC – 03.04.05.017-2). Discutir individualmente RxT (após a QT) em casos selecionados (margens positivas ou exíguas, múltiplos linfonodos mediastinais comprometidos, extravasamento extracapsular ou dissecação mediastinal linfonodal inadequada).

4.2.4. Paciente operado com margem comprometida, > N1 ou N+ com extensão extracapsular ou T3 volumoso ou T4

- Tratamento adjuvante com QT com cisplatina, 100 mg/m² EV, em 2 horas, nos D1, D22 e D43 (ou, alternativamente, 30 mg/m² EV em 1 hora, semanalmente) (APAC – 03.04.05.016-4), administrada concomitantemente à RT.

4.3. TRATAMENTO PALIATIVO

4.3.1. Estádios clínicos “N2 volumoso”, N3 e “T4 invasivo”

- Para pacientes com bom índice de desempenho e relativamente jovens, indicamos quimioterapia (QT) concomitantemente com radioterapia (RT), com o esquema do SWOG S9504, que consiste de cisplatina, 50 mg/m² EV, nos D1, D8, D29 e D36, e etoposídeo, 50 mg/m² EV, do D1 ao D5 e D29 ao D33 (concomitante à RT 61 Gy) (APAC – 03.04.04.009-6).
- Para pacientes com baixo índice de desempenho ou idosos, indicamos QT de indução por 3 a 4 ciclos, seguida de RT de consolidação ou RT isolada (ver esquemas estágio IV)

4.3.2. Estádio clínico IV

- Pacientes com bom índice de desempenho (ECOG 0 a 2) e idade < 70 anos - realizar 4 a 6 ciclos de um dos seguintes regimes de QT:
 - Cisplatina 75 mg/m² EV, em 3 horas, no D1, e gencitabina, 1.000 mg/m² EV, em 30 minutos, nos D1 e D8, a cada 3 semanas;
 - Carboplatina AUC 6 EV, no D1, e paclitaxel, 200 mg/m² EV, em 3 horas, no D1, a cada 3 semanas (APAC – 03.04.02.021-4).

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 5 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO N°: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

Pacientes com baixo índice de desempenho, idade superior a 70 anos ou contraindicação para o uso de análogos da platina - primeira linha com QT com agente isolado ou combinações que não contenham cisplatina. Os seguintes agentes podem ser utilizados em monoterapia:

- Gencitabina 1.000 mg/m² EV, nos D1 e D15, a cada 28 dias;
- Vinorelbina 25 mg/m²/semana EV;
- Carboplatina, AUC 2;
- Paclitaxel, 80 mg/m² EV, nos D1, D8 e D15, a cada 4 semanas.

4.3.3. Pacientes com doença metastática, com mutação do EGFR

- Discutir indicação de inibidor de tirosina-quinase via Secretaria Estadual de Saúde (PRIMEIRA LINHA)
- Erlotinibe 150mg/d, contínuo
- Gefitinibe 250mg/d, contínuo

4.4. TRATAMENTO PALIATIVO DE SEGUNDA LINHA

- Discutir conforme idade e PS do paciente, além de sintomatologia da doença.
- Docetaxel 75 mg/m² EV, no D1, a cada 21 dias;
- Pemetrexede, 500 mg/m² EV, em 10 min, a cada 3 semanas (se adenocarcinoma) - com reposição de ácido fólico e B12.

5. AUTORES

- Mariana Lopes Zanatta
- Ana Lúcia Coradazzi
- Mayra Calil Jorge
- Ingrid Vieira Lyra

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 6 / 7 – EMISSÃO: 17/11/203 – VERSÃO N°: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

6. REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS nº 957, de 26 de setembro de 2014. **Aprova o texto das "Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas - Carcinoma de Pulmão"**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0957_26_09_2014.html.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia. Secretaria de Atenção à Saúde**. Brasília - DF, 2014.

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber

PROTOCOLO CLÍNICO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA

PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS

PRC AMB ONCO 015 – PÁG - 7 / 7 – EMISSÃO: 17/11/2023 – VERSÃO Nº: 01- 14/08/2025 – PRÓXIMA REVISÃO: 14/08/2027

7. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS		
1.2. Área Responsável: Ambulatório de Oncologia do Hospital Estadual de Botucatu		
1.3. Data da Elaboração: 17/11/2023 Total de páginas: 07 Data da Revisão: 14/08/2025 Número da Revisão: 01		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dado pessoal (nome completo) durante a vigência do documento: PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Mariana Lopes Zanatta;	Ambulatório de Oncologia	
Ana Lúcia Coradazzi	Ambulatório de Oncologia	
Mayra Calil Jorge	Ambulatório de Oncologia	
Ingrid Vieira Lyra	Ambulatório de Oncologia	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO)		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: PRC AMB ONCO 015 – PROTOCOLO DE CÂNCER DE PULMÃO - NÃO PEQUENAS CÉLULAS. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 21/08/25	Chefe do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori	
	Assinatura:	
Data: / /	Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva	
	Assinatura:	
Data: / /	Diretoria de Assistência à Saúde: Silke Anna Theresa Weber	
	Assinatura:	

Aprovação do Médico Coordenador do Serviço de Oncologia: Lucas Oliveira Cantadori

Aprovação Diretoria Clínica: Marise Pereira da Silva

Aprovação da Diretoria de Apoio à Assistência: Silke Anna Theresa Weber